

BECASSEAU VARIABLE – *CALIDRIS ALPINA* (L. 1758)

Annexe II de la Convention de Berne et de la Convention de Bonn, Espèce protégée en France, liste rouge mondiale UICN : préoccupation mineure, liste rouge des oiseaux de France : non applicable.

Répartition géographique


L'aire de reproduction s'étend de l'Islande à la Sibérie, surtout au niveau de la toundra arctique. Pendant l'hiver, les oiseaux occupent les rivages côtiers, essentiellement au niveau des baies et estuaires abrités, depuis le Danemark jusqu'au bassin méditerranéen et l'Afrique de l'ouest.



Figure 57 : Bécasseau variable

Population dans le site

Le Bécasseau variable fréquente le site Ramsar du Golfe du Morbihan et de la Rivière de Penef presque toute l'année mais les effectifs importants sont essentiellement observés durant la période d'hivernage. Les premiers hivernants sont observés en septembre, les derniers en mars. Les stationnements sont surtout importants dans la zone du Golfe à proprement dit, avec des effectifs atteignant plus de 26 000 individus trois mois de suite (moyenne des effectifs maximaux en février à 26 800 oiseaux). En dehors de cette période, les effectifs n'atteignent pas le millier d'individus.



Sur le secteur de Penef, les effectifs n'augmentent pas de façon aussi importante puisqu'ils passent de quelques centaines en été à un maximum de 2 195 en décembre. Au cours des 10 dernières années, les effectifs maximaux sont globalement stables avec en moyenne 3 460 oiseaux sur le secteur « Locmariaquer-Penef ».

Figure 58 : Effectifs comptés (pic d'abondance de la saison) pour le Bécasseau variable à l'échelle du site Penvins-Penef (protocoles de comptages standardisés) de 2000 à 2010 – Source : Roger Maheo-comptages IWC/Wetlands International




Figure 59 : Répartition des Bécasseaux variables

Habitat de l'espèce

Pendant la période hivernale, le Bécasseau variable est largement réparti sur toutes les zones intertidales du site. Lors de la marée descendante, il existe de nombreux déplacements inter-secteurs, selon des axes ouest-est. Les oiseaux se dispersent en recherche de nourriture (petits invertébrés benthiques) sur l'ensemble des vasières accessibles, en commençant par les vasières à proximité des zones de repos. Certains groupes gagnent des vasières plus éloignées, en fonction, en particulier, de la tranquillité sur les zones de repos. Il existe de nombreux échanges entre les secteurs de Penerf et le Golfe du Morbihan.

Menaces potentielles

Les effectifs hivernants en France sont en déclin. Le site Ramsar du Golfe, zone d'importance internationale pour l'espèce (critère 14 000 individus) fait partie des 4 principales zones d'accueil du Bécasseau variable hivernant en France avec plus de 10% des effectifs métropolitains.

Les menaces pesant sur l'espèce peuvent être de deux ordres : une modification des habitats naturels de l'estran, zones de nourrissage, et un dérangement trop important sur les secteurs de repos et d'alimentation.