

## CODE UE 2000 : A138 – GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU – *CHARADRIUS ALEXANDRIUS* (L. 1758)

*Annexe I de la directive Oiseaux, Annexe II de la Convention de Berne et de la Convention de Bonn, Espèce protégée en France*

### Répartition géographique

Le Gravelot à collier interrompu est une espèce cosmopolite. Dispersée en Europe, son aire de distribution côtière s'étend du Sud de Danemark à l'ensemble du pourtour méditerranéen et de la mer Noire. La population européenne estimée à 30 000 couples. L'effectif national (estimé à 1 500 couples nicheurs en 1996, Deceuninck & Mahéo, 1998) a été suivi assez précisément depuis une vingtaine d'année et semble maintenir une relative stabilité.



Figure 51 : Gravelot à collier interrompu

### Population dans le site

Le recensement de 1984 faisait état de 186-235 couples en Bretagne (Dubois & Mahéo), mais les auteurs estiment la population à 300 couples, soit 30% de la population nationale. Depuis le milieu des années 1980 la situation semble avoir bien changé. En baie d'Audierne, où le Gravelot à collier interrompu est très suivi, les effectifs sont divisés par deux entre les années 1988 et 1992. Les effectifs de Gravelots à collier interrompu étaient estimés en 1995-1996 entre 170-193 couples reproducteurs, soit 13% de la population nationale, répartis sur les quatre départements bretons.

Dans le site Ramsar, les oiseaux semblent avoir abandonné le cordon dunaire de St Pierre à Locmariaquer ainsi que l'espace littoral de Bétahon à Ambon. Le Gravelot à collier interrompu ne se reproduit plus qu'à Sarzeau, dans le site Natura 2000 de Penerf.

Sur ce site, aucun suivi régulier n'a été mis en place et nous ne disposons que de données sporadiques. Pourtant les quelques chiffres disponibles montrent bien l'importante chute des effectifs sur le cordon dunaire de Suscinio à Sarzeau. Le 10 mai 1998, 10 couples dont 7 pontes en cours d'incubation sont dénombrés dans un petit carré de dune rétro-littoral. En 2003, 6 couples dont 5 pontes sont recensés, il n'y a plus que 2 couples en 2005 et depuis cette date entre 1 et 3 couples tentent chaque saison de mener à bien sa couvée.

### Habitat de l'espèce

En Bretagne, il s'agit d'une espèce emblématique du littoral du fait de sa rareté et de la forte valeur patrimoniale des milieux qu'elle occupe : cordons de galets, laisses du haut de plage et dunes mobiles.

### Menaces potentielles

Bien que s'adaptant aux modifications de son habitat de prédilection, cet oiseau est confronté à la diminution croissante de son biotope de reproduction, le cumul de différents problèmes a pour conséquences un faible succès de la reproduction, largement insuffisant pour assurer le maintien de la population dans le site Natura 2000 de Penerf :

- le dérangement humain est majeur, surtout lors des fortes fréquentations estivales du littoral et des dunes par les plagistes et autres activités connexes
- un très faible succès de la reproduction et dû à un fort taux de prédation sur les pontes et les poussins par les chiens en promenade et la Corneille noire
- Il y a un manque de sites attractifs et gérés de manière favorable pour l'espèce

### Programmes de conservation en cours

Le Gravelot à collier interrompu fait l'objet d'un Plan Régional d'Actions, sous forme de Contrat Nature porté par Bretagne Vivante-SEPNB, pour la période 2011-2013.